

AL TERMINAR EL VERANO HAY CORRECCION DE CALCULOS AGRICOLAS

**Cosecha de trigo superior en un seis por ciento a la de 1958
PROBABLE PRODUCCION DE SEISCIENTAS MIL TONELADAS DE ACEITE**

No nos abandonan las fuertes perturbaciones atmosféricas que en este periodo del declive del verano tienen efectos muy contrapuestos. Dificultan considerablemente el remate de los trabajos de recolección—trilla y limpia de mieses en las regiones centro y norte—con los perjuicios consiguientes para el fruto a causa del exceso de humedad. En cambio, y aparte los daños importantes causados por pedriscos o trombas de agua en otros cultivos, estas frecuentes precipitaciones favorecen de manera notable el desarrollo de las cosechas en evolución, pero podrían resultar perniciosas, si continúan, para la de uva.

Naturalmente, estos violentos fenómenos atmosféricos imponen la debida corrección de cálculos sobre producciones agrícolas, correcciones que en líneas generales hemos señalado ya en estas columnas. Por lo que a la producción de trigo se refiere, que hemos cifrado en unos 45 millones de quintales métricos, el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura dice en su "Resumen de la situación de campos y cosechas" correspondiente al mes de agosto, que los rendimientos que se están obteniendo en las distintas regiones son algo inferiores a las previstas al comenzar dicho mes. No obstante—añade—, el conjunto de la cosecha triguera es superior al de la pasada campaña en cerca de un seis por ciento, y aunque en algunas regiones, como Andalucía occidental, Levante, Cataluña-Baleares, Extremadura y zona cantábrica, la producción ha sido menor que en la pasada campaña; en otras es bastante mayor, como en Aragón (casi el doble), Castilla la Vieja y leonesa (un 20 por 100 más), y Andalucía oriental (del 10 al 15 por 100 mayor).

(Añadido ese seis por ciento a los 43 millones de quintales métricos en que ciframos, sin rectificación posterior, la cosecha de 1958, tenemos un total de 45.280.000 quintales; es decir, prácticamente la misma cifra que con reiteración hemos fijado en las columnas de A B C como cosecha probable en 1959.)

En lo que se refiere a granos de pienso, para los que también hemos pronosticado producciones algo mayores que las obtenidas en la campaña anterior, el mismo Servicio las confirma al decir que la cebada muestra relativamente mejor cosecha, pues es superior en un 15 por 100 a la producción de la campaña anterior. Sólo las regiones de Andalucía occidental y Extremadura acusan disminuciones apreciables respecto al año último.

Añade que la producción de leguminosas de otoño es buena en general, confirmándose que hay mayores cosechas que el pasado año. Continuaron recolectándose garbanzos, en general con medianos rendimientos, en parte de Andalucía occidental, debido a los ataques de "rabia" y "fusariosis".

Los rendimientos del maíz son deficientes en los secanos de las zonas tempranas de Andalucía occidental. La falta de precipitaciones en algunas comarcas de Galicia perjudicó a este cultivo, que en el resto de la Península vegeta bien, así como las judías. A pesar de ello, la cosecha de maíz es mayor que la de 1958.

Se van confirmando las buenas perspec-

tivas de la cosecha de arroz, cuya siega se ha iniciado en Levante para las variedades precoces.

Continuó la recolección de uva de mesa con normalidad, siendo en general de buena calidad, y habrá mermas en la de vinificación como consecuencia de los daños causados por el pedrisco en algunas zonas, así como por los ataques de "mildeu" en Castilla la Vieja, Logroño-Navarra, León, Albacete, Galicia y Alava, ataques que persisten en las provincias de Logroño, Palencia y Zamora. En conjunto, se espera que la cosecha sea algo menor que la pasada.

LA COSECHA DE ACEITUNA

El olivar presenta, con carácter casi general, una muestra de fruto extraordinariamente abundante y de buen tamaño. Nues-

tras impresiones particulares son de que la cosecha de aceite puede superar las 550.000 toneladas, e incluso aproximarse a las 600.000, con lo cual se rebasarían las cifras hasta ahora conseguidas. Todo depende de que el tiempo siga favoreciendo el desarrollo vegetativo. El Servicio de Estadística antes mencionado hace notar que en Cuenca y Cádiz la cosecha será corta por caída de fruto y daños causados por pedriscos. Además, en la provincia de Tarragona es intenso el ataque de "mosca".

OTRAS PRODUCCIONES

Por lo que se refiere a los agrios, dice que, en general, muestran buen aspecto, pero posteriormente, como se sabe, hay que lamentar los daños causados por un pedrisco en una comarca valenciana.

En cuanto a la remolacha azucarera—cuyo rendimiento en sustancia dulce hemos calculado en unas 500.000 toneladas—, se subraya que en general continúa su buen desarrollo vegetativo en todas las regiones, mientras en Sevilla prosigue el arraigo de esa raíz con buenos rendimientos.

En patatas impera la impresión de abundancia, tanto en las de la época como en las tardías. Se exceptúa a gran parte de Galicia, afectada por la sequía.

Diremos finalmente que las impresiones

A B C. DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 1959.

son buenas, asimismo, por lo que se refiere al algodón y al tabaco.

GANADERIA

En el "frente" ganadero, y desde el punto de vista de alimentación de la cabaña, hoy por hoy no hay más novedad desfavorable que la representada por la mala montanera en Extremadura. En Salamanca la producción bellotera será desigual a causa de ataques de "lagarta" a los encinares. Por lo demás, en cuanto a pastos y rastrojeras—según nuestras propias informaciones—, la situación de la ganadería es buena.