

AUNQUE HA MEJORADO SU ESTADO GENERAL *30 octubre* FRANCO CONTINUA *79* GRAVE

sigue la insuficiencia cardíaca congestiva y no se ha modificado la ascitis; la tensión arterial es normal

Madrid. (De nuestra Redacción.) El estado del Generalísimo continúa siendo muy grave. Aunque a lo largo del día de ayer los partes médicos facilitados eran más tranquilizadores, en todos ellos persiste la gravedad en el pronóstico. El último, firmado anoche, es el siguiente:

«A las 20,30 horas, la evolución clínica de S. E. el Jefe del Estado ha sido la siguiente desde las 13,30 horas: En las últimas veinticuatro horas ha mejorado el estado general, manteniendo un nivel de consciencia normal.

Continúa con el mismo grado de insuficiencia cardíaca congestiva. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca son normales con extrasístoles ventriculares muy aisladas. Al reanudarse la actividad intestinal se han apreciado heces hemorrágicas en forma de melena. La ascitis no se ha modificado.

El pronóstico no ha variado.

Firmado: Vicente Pozuelo Escudero, Luis Pescador del Hoyo, Vital Aza y Fernández-Nespral, Eloy López García, José María Gómez Mantilla, José Luis Palma Gámiz, Minguéz Enriquez de Salamanca, Ernesto Castro Fariñas, Jesús Señor de Uria, Luis Alonso-Castrillo Aladrén, Gabriel Artero Guirao, Roberto Llauredó Sabé, Luis Sánchez Sicilia, Carlos Marina Fiol, J. Parra Lázaro, Manuel Hidalgo Huertas, María Paz Sánchez Aguado, Joaquín Carbonell Cadenas de Llano y Francisco Fernández Justo.

Palacio de El Pardo, 29 de octubre de 1975.»

N. de la R.—El parte médico fechado a las ocho y media de la tarde de ayer es, evidentemente, más satisfactorio que los últimos habidos en las veinticuatro horas anteriores. Puede basarse esta afirmación en la posibilidad de que la trombosis venosa mesentérica realmente gravísima, que se apuntó el martes por la noche, haya quedado obviada, quizá porque no haya tenido la gravedad en un primer momento pensada.

No de otra manera puede interpretarse el hecho de la reanudación de la actividad intestinal que se afirma en el parte de las ocho y media de ayer. En efecto, cuando sucede este tipo de trombosis, es decir la formación de coágulos en las venas mesentéricas, la parálisis inmediata abdominal impide literalmente la evacuación de heces y gases.

LA ASCITIS.—Sin embargo, la ascitis, que viene siendo cuadro patológico normal en los últimos días y que consiste en una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, continúa sin cambio alguno. Un síntoma escasamente positivo, puesto que sigue, en estos momentos, cayendo líquido seroso en el abdomen, suero procedente del torrente circulatorio.

La melena a que hace referencia el parte es la expulsión de sangre alterada por el ano, y procede de una úlcera sangrante que, según todas las informaciones, padece el Jefe del Estado en el tracto digestivo y en el intestino. Hay que decir a este respecto que uno de los síntomas que hacen sospechar la trombosis venosa mesentérica, denominación que aparecía el martes y que en los partes de ayer, miércoles, fue suavizada, son las hemorragias intestinales, fuertes do-

lores, vómitos y una parálisis de la zona afectada. Cuando se presentan estos problemas, el vientre se encuentra totalmente rígido, la sangre no puede circular por las asas intestinales y los tejidos se necrosan, es decir, mueren prácticamente. La consecuencia inmediata son las nuevas hemorragias e incluso el colapso.

CAMBIOS DE RITMO.— Los extrasístoles ventriculares, signo patológico que también aparece por primera vez en un parte del Jefe del Estado, son contracciones prematuras, a destiempo, que nacen independientes del ritmo cardíaco normal. Los extrasístoles se producen por una excitación anormal, incluso en ocasiones imprevista, que se intercala en el ritmo normal y que es muy difícil de eliminar.

Parece posible que un paciente cuando no se encuentra bajo los efectos de algún calmante o, simplemente